

Produits sans fumée

Des poisons déguisés en bonbons.

Les fabricants de produits du tabac sans fumée, comme le tabac à mâcher, rendent leurs produits plus attrayants pour les jeunes en leur donnant des saveurs de bonbons.

Il n'y a pas si longtemps, l'usage du tabac à mâcher se limitait presque uniquement aux communautés rurales de l'Ouest Canadien. Aujourd'hui, son usage se répand de plus en plus en passant par les vestiaires et les gymnases d'écoles secondaires.

L'usage du tabac à mâcher ou à chiquer par les ados et les jeunes adultes prend de plus en plus d'ampleur depuis que les fabricants mettent sur le marché des produits spécialement conçus pour leur plaire.

Les fabricants ont introduit des produits sans fumée dans toute une gamme de saveurs de bonbons et de fruits. Le nombre de jeunes qui essaient ces saveurs augmente, d'autant plus que les arômes masquent le goût désagréable du tabac et en facilitent la consommation, ce qui mène ultimement à la dépendance, voire la toxicomanie.

Les saveurs de bonbons ont augmenté l'usage du tabac à mâcher au Canada

Vers 2005, quand le tabac à mâcher aromatisé aux saveurs de bonbons a fait son apparition au Canada, son usage a commencé à s'accroître, renversant ainsi une tendance à la baisse qui datait de 1998. Les 15 à 19 ans constituent un quart de tous les usagers du tabac à mâcher, même s'ils ne représentent qu'un septième de la population.¹

En 2006, le fabricant National Smokeless Tobacco Company (UST) annonçait que 7 des 10 meilleurs vendeurs de produits sans fumée étaient aromatisés et que leurs chiffres d'affaires s'étaient accrus grâce aux nouvelles saveurs du tabac à mâcher et aux produits de tabac oral en sachets.² Les ventes ont d'ailleurs augmenté de 50 % entre 1990 et 2005.³




Même look. Même saveurs.

Des produits du tabac qui sont cancérigènes et qui engendrent une dépendance sont vendus dans des emballages et des saveurs s'apparentant à la gomme.


« Le Skoal aux cerises c'est pour quelqu'un qui aime le goût des bonbons, si tu vois ce que je veux dire ».⁴

- représentant de UST expliquant le rôle des saveurs

Prévalence du tabac à mâcher par groupe d'âge, Canada 2007



Le quart des consommateurs de tabac à mâcher sont des jeunes ayant moins de 19 ans.



L'usage des produits du tabac sans fumée est un problème majeur dans plusieurs provinces canadiennes et la situation s'aggrave.

Dans certaines provinces du Canada, la consommation de produits de tabac sans fumée est devenue aussi populaire que la cigarette chez les adolescents de sexe masculin. Dans le nord-ouest de l'Ontario, pour chaque 5 élèves du secondaire (9-12^{ème} année), 1 mâche du tabac (15 %), ce qui est comparable au taux de tabagisme de la région.^{5,6} Près de la moitié des adolescents qui disent avoir consommé du tabac à mâcher récemment n'ont jamais fumé une cigarette de leur vie.⁷

Suite à son apparition sur le marché américain, le tabac à mâcher aromatisé a connu une augmentation fulgurante de 30 % chez les adolescents du secondaire, alors que la consommation de ce produit est demeurée stable chez la population adulte.⁸

L'industrie cible les enfants

La consommation de tabac sans fumée est beaucoup plus répandue chez les adolescents et les jeunes adultes que dans le reste de la population. (Les jeunes âgés de 15 à 19 ans représentent le quart de tous les consommateurs, bien qu'ils ne représentent que 7 % de la population canadienne et 8 % de l'ensemble échantillonné.) **La probabilité qu'un adolescent ait consommé du tabac à usage oral au cours du dernier mois est trois fois plus élevée que chez les Canadiens âgés de 25 ans et plus.** 40 000 Canadiens ayant moins de 19 ans ont affirmé avoir consommé du tabac à usage oral dans le dernier mois.⁹

Le tabac sans fumée demeure un produit très nuisible pour la santé

Santé Canada met en garde la population contre les dangers pour la santé que représente le tabac à mâcher.¹⁰ Ces produits peuvent causer des cancers de la bouche et de la gorge, augmenter le rythme cardiaque et le rendre irrégulier et ils peuvent aussi causer de sérieux problèmes dentaires.

De nombreux gouvernements ont complètement interdit les produits du tabac sans fumée.

L'Australie, Israël, le Japon, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande et des pays de l'Union européenne, mise à part la Suède, ont interdit tous les produits du tabac sans fumée, incluant ceux qui sont aromatisés.¹¹

Références

- 1 Médecins pour un Canada sans fumée, 2008. Canadian per-capita consumption of pipe, snuff, chewing tobacco and cigars 1998-2007. Fact sheet, juin 2008.
www.smoke-free.ca/factsheets/pdf/cigars,%20snuff,%20chewing%20and%20pipe%20tobacco.pdf
- 2 National Smokeless Tobacco Company, 2007. Présentation fait l'événement « Convenience U CarWacs », 7 & 8 mars, 2007, Toronto. www.conveniencecentral.ca/images/showguide.pdf
- 3 The Convenience U Carwacs Show Workbook. 2007, p. 38, p. 41. Aussi cité par Convenience Central, mai 2006 – Convenience U Mars 2007.
www.conveniencecentral.ca/archive/2006/may/focuson.asp?sid=032C4950B6E642549344C457E3EBD9C3
- 4 Bob Deets, un ancien représentant des ventes de la United States Smokeless Tobacco, cité dans le Wall Street Journal, 26 octobre 1994; tel que rapporté par Tobacco Free Kids. “United States Smokeless Tobacco Company. A Real Public Health Bandit”. www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0284.pdf
- 5 Campagne Flavourgone, 2008. Smokeless Tobacco/Chewing Tobacco Toolkit.
www.flavourgone.ca/images/Smokeless_Tobacco_Toolkit.pdf
- 6 Sieswerda LE, Starkes JM, Adlaf EM. Student Drug Use in Northwestern Ontario: Results of the Northwestern Ontario Student Drug Use Survey, 1997 – 2005. Thunder Bay District Health Unit, Thunder Bay, Ontario: 2006.
www.tbdhu.com/NR/rdonlyres/2C52E632-4AB7-414C-AAB2-66819228AD00/0/05NWOSDUSExecSummary.pdf
- 7 Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC), 2007. Analyse de Médecins pour un Canada sans fumée.
- 8 National Survey on Drug Use and Health. Smokeless Tobacco Use, Initiation, and Relationship to Cigarette Smoking: 2002 to 2007
www.oas.samhsa.gov/2k9/smokelessTobacco/smokelessTobacco.pdf
- 9 Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC), 2007. Analyse de Médecins pour un Canada sans fumée (Nombre pour usage durant les 30 dernier jours : 15-19 ans : 38008; 20 - 24 ans : 34129, plus de 25 ans 85315. Total des usagers durant les 30 derniers jours : 157452)
- 10 Site Internet de Santé Canada. Le tabac sans fumée. www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/body-corps/smokeless-sansfume-fra.php
- 11 Roemer R. Legislative Action to Combat the World Tobacco Epidemic. Geneva: World Health Organization, 1993.